

DIFFÉRENCES ENTRE...

LES ABEILLES DOMESTIQUES



LES GUÊPES



LES BOURDONS



LEUR CORPS

- Environ 12 mm
 - Corps velu
 - Silhouette trapue
 - Couleur varie entre le brun foncé et le jaune
- Environ 10 à 25 mm
 - Corps lisse, mois poilu
 - Silhouette élancée
 - Abdomen clairement distinct du thorax avec des lignes noires très marquées
 - Couleur jaune et noir
- Environ 15 à 25 mm
 - Corps très velu
 - Silhouette très trapue
 - Corps de couleur noir et jaune, peut porter des motifs blancs ou oranges

LEUR COMPORTEMENTS CARACTÉRISTIQUES

- N'importune pas en général
 - L'ouvrière meurt après une piqûre
 - Prélève du nectar et produit du miel
 - Se nourrit de nectar, pollen et eau
- Prélève un peu de nectar, mais ne produit pas de miel
 - Carnivore : elle nourrit ses larves de petits insectes ou de morceaux de viande (c'est pourquoi elles peuvent être présentes pendant nos pique-niques)
- Se nourrit de nectar et de pollen
 - Vol bruyant

LEUR HABITAT

- Emplacement définitif d'une colonie d'abeilles domestiques
- Constitué de rayons parallèles en cire
- Essaim pour se reproduire
- Emplacement définitif d'une colonie de guêpes
- Constitué d'un papier élaboré de fibres végétales mélangées à de la salive
- Apparence de vieux papier grisâtre
- Constitué de cellules de cires
- Souvent sous terre et dans une cavité déjà existante
- Fortement déconseillé de détruire son nid car le bourdon est très utile à la pollinisation



COMMENT AGIR AUTOUR DES POLLINISATEURS ?

- Rester calme
- Observez et remarquez leurs mouvements de fleurs en fleurs
- Balayer doucement avec votre main pour les éloigner

MAIS ALORS... QU'EST-CE QU'UN ESSAIM ?

Un essaim survient lorsque la reine et une partie des abeilles quittent la ruche pour former une nouvelle colonie. L'essaim n'est pas dangereux mais peut-être impressionnant !

Il est nécessaire de contacter un.e apiculteur.rice pour procéder rapidement à sa récupération.

